

Phéromone pour le carpocapse des pommes, poires, noix, coings *Cydia pomonella*

Produit : Capsule à phéromone
Conditionnement : blister de 1 capsule.

Cible : le carpocapse des pommes, poires, noix, coings *Cydia pomonella*.

Doses :

Capsule <i>Cydia pomonella</i>	Dose	Fréquence et intervalle d'introduction
Préventif	1 capsule/arbre	1 capsule pour la saison
Curatif léger	-	-
Curatif lourd	-	-

Introduction

- ✓ Utiliser un système de piège Delta.
- ✓ Déposer la capsule sur la plaque engluée prévue à cet effet et suspendre le piège sur les charpentières sous le couvert végétal à l'abri de la lumière et de l'humidité.

Date de mise en place

Introduction de fin avril à Août (lorsque la température atteint 15°C).

Stockage

- ✓ Stockage possible 1 à 2 ans au congélateur.

Remarque

- ✓ Lors de la mise en place de la capsule, éviter le contact avec la peau.

Mode d'action

La capsule diffuse une phéromone reproduisant celle émise par le papillon femelle de *Cydia pomonella*. Ce qui permet de capter le mâle ailé de cette espèce pour nuire à la reproduction et détecter les premiers vols d'individus.

Contrôle de succès

- ✓ Quelques jours après la mise en place, les premiers individus mâles sont visibles dans les pièges.
- ✓ Plus tard dans la saison, les dégâts doivent être beaucoup moins visibles.