

**Palmiers**  
Steinernema Carpocapsae

**Papillon du palmier**  
Paysandisia archon



**Charançon rouge**  
Rhynchophorus ferrugineus



Disponible en 10, 25, 50, 100, 250 et 500 millions

**Mouches du terreau**  
Steinernema Feltiae



*Scaridae*

Disponible en 3, 5, 10, 25, 50, 100 et 250 millions

**Thrips**  
Steinernema Feltiae



*Thrips*

Disponible en 5, 10, 25, 50, 100 et 250 millions

**Tigre du platane**  
Steinernema Carpocapsae



*Corythucha ciliata*

Disponible en 10, 25, 50, 100, 250 et 500 millions

**Vers Gris - Chenilles Noctuelles**  
Steinernema Carpocapsae

**Noctuidae**



Disponible en 5, 10, 25, 50, 100 et 250 millions

**Vers Blancs**  
Heterorhabditis Bacteriophora

**Otiorynque - Hanneton**



Disponible en 3, 10, 25, 50, 100 et 250 millions

**Doryphore**  
Steinernema Carpocapsae

**Doryphore de la pomme de terre**



Disponible en 10, 25, 50, 100 et 250 millions

**Votre opinion est précieuse pour nous !**  
Nous avons le plaisir de vous offrir un code promotionnel de **20%**, valable sur votre prochain achat de nématodes sur notre site **solunema.fr**

**Pour obtenir votre code**, faites une évaluation du produit que vous venez de recevoir, puis envoyez nous votre numéro de facture à l'adresse **solunema@k3d.fr**

SOLUNEMA.FR



## Thrips

Steinernema Feltiae

### Traitement par NÉMATODES

Formulation Gel Longue durée



 6 semaines de tranquillité

 Application facile par arrosage ou pulvérisation foliaire

 À conserver au frais dès réception

**Tout Pour Les Nuisibles - France Nuisibles**

31 allée de la Poste  
42470 Saint Symphorien de Lay

 Infos - Conseils  
**04 74 05 25 56**  
**solunema@k3d.fr**

Les **thrips** sont de petits insectes nuisibles appartenant à l'ordre des Thysanoptères. Mesurant généralement entre 1 et 2 millimètres de long, ces minuscules créatures sont souvent difficiles à discerner à l'œil nu en raison de leur taille. Ils se trouvent dans une grande variété d'environnements et se nourrissent de la sève des plantes.

Les **dégâts causés par les thrips** sur les plantes sont nombreux et variés.

Les plantes attaquées par les thrips présentent une panoplie de symptômes dévastateurs. Armés de pièces buccales pointues, les stylets, ces insectes percent les tissus végétaux pour en aspirer la sève. Les dommages qu'ils causent se manifestent par des taches argentées ou bronzées sur les feuilles, des déformations, des nécroses, et des frisures ou enrroulements foliaires. Les fleurs ne sont pas épargnées : elles peuvent présenter des décolorations, des nécroses ou un développement atypique. De plus, certains thrips sont vecteurs de virus, ce qui peut accentuer les dommages subis par les plantes.

## TOUT POUR LES NUISIBLES

*Des produits de pro pour une lutte efficace*

Pièges, phéromones, répulsifs, matériel de traitement,  
Venez découvrir des produits complémentaires sur notre site.  
Depuis 2006 à votre service.

Toutes les commandes passées avant 14h sont expédiées le jour même.



PIEGEAGE  
INSECTES

TOUTPOURLESNUISIBLES.FR



MATÉRIEL DE  
TRAITEMENT



AUXILIAIRES



LUTTE  
GASTEROPODE



RENFORCER  
PRÉVENIR

### IMPORTANT

- Après réception, conservez les nématodes au frais, entre 4 et 6 °C, dans votre réfrigérateur. Assurez-vous de les garder à l'abri de la lumière. Ne pas congeler.
- Pour les préparer à l'utilisation, sortez-les du réfrigérateur et laissez-les à température ambiante pendant environ 30 minutes. À utiliser dès que les températures sont supérieures entre à 10° C
- À utiliser tôt le matin ou tard le soir pour éviter les UV, car les nématodes sont sensibles aux UV.
- Maintenir la terre légèrement humide non détrempée pendant aux moins 15 jours après le traitement.
- Les Nématodes ne craignent pas forcément la chaleur (<30°C), les conserver au froid vise uniquement à les plonger en cryptobiose, les maintenant ainsi en état de léthargie.
- À température ambiante, les nématodes continuent leur développement. Par contre sans "nourriture", ils finiront par mourir de "faim" au bout d'une semaine environ.
- Pour la pulvérisation, retirez les filtres et utilisez une buse d'un diamètre supérieur à 0.5 mm (35 mesh). Il est préférable d'opter pour une buse de type "jet conique" creux à haut débit.
- Ne stockez pas la solution une fois qu'elle est diluée avec de l'eau. Les nématodes vont s'asphyxier et mourir.

## Comment utiliser les nématodes pour traiter les thrips ?

### 1. Identifier le problème

Les thrips sont de petits insectes nuisibles qui peuvent causer des dommages aux plantes. Leurs attaques se manifestent par des déformations, des taches argentées ou bronzées sur les feuilles, des nécroses et un développement anormal des fleurs. Il est important d'identifier correctement le problème afin de choisir le traitement approprié.

### 2. Préparation de la solution de nématodes

Sortez les nématodes du réfrigérateur 30 minutes avant leur utilisation pour les acclimater. Gardez-les à l'abri de la lumière directe et des UV pendant ce temps

Commencez par diluer le contenu complet du pot ou du sachet de nématodes dans un petit récipient rempli d'eau propre à température ambiante. Bien mélanger : la présence de petits grumeaux n'est pas problématique.

Versez ensuite cette préparation dans un arrosoir, un pulvérisateur ou un bidon, puis ajoutez-y la quantité d'eau nécessaire, à une température comprise entre 15°C et 25°C (consultez le tableau de dosage pour la quantité précise). Mélangez de nouveau et procédez rapidement à l'application. Assurez-vous de remuer régulièrement le mélange afin d'éviter que les nématodes ne se déposent au fond du récipient.

### 3a. Préparation du sol

Avant d'appliquer la solution contenant les nématodes, humidifiez légèrement le sol. Cette humidité facilitera le déplacement des nématodes, qui, dépourvus de pattes, se servent de l'humidité et des particules du sol pour se mouvoir. Veillez toutefois à ne pas trop saturer le sol d'eau, car un excès d'humidité pourrait compromettre la survie des nématodes, risquant ainsi de les asphyxier.

### 3b. Préparation du feuillage

Humidifiez soigneusement le feuillage de vos plantes, en insistant sur la face supérieure et la face inférieure des feuilles. Cette étape est cruciale pour garantir la mobilité et l'efficacité des nématodes. Privilégiez le traitement en soirée afin d'éviter l'exposition directe des nématodes aux rayons UV du soleil qui les endommagent.

### 4. Application par pulvérisation ou arrosage des nématodes au sol et sur le feuillage

Pulvérisez la solution de nématodes sur la surface de la terre infectée. Arrosez suffisamment pour que la solution soit absorbée par la terre.

Pulvérisez aussi uniformément la solution sur les feuilles, en veillant à couvrir l'ensemble du feuillage, des deux côtés. Maintenez la surface des feuilles humide pendant au moins 2 heures après l'application pour assurer la pénétration des nématodes et leur efficacité contre les larves de thrips. Tout nématode n'ayant pas trouvé et pénétré une larve pourra mourir le lendemain à cause des rayons UV.

### 5. Continuer l'arrosage dans le cas du traitement du sol

Pour maintenir leur efficacité, continuez d'arroser régulièrement pendant au moins deux semaines le sol légèrement. Les nématodes ont besoin d'humidité pour se déplacer dans le sol et trouver les larves des thrips.

### 6. Surveiller les résultats

Vous devriez remarquer une diminution de la population après une dizaine de jours. Veillez noter que les nématodes ne traitent que les larves et les chrysalides des thrips et non la forme adulte volante. Pour les formes adultes, utilisez des plaques de glu chromatiques bleues pour les piéger. Si les thrips persistent, il peut être nécessaire de répéter le traitement. Il est important de suivre les instructions d'application pour obtenir les meilleurs résultats dans le traitement des thrips avec les nématodes *Steinernema feltiae*.

## Comment les nématodes agissent-ils ?

Dans le sol ou sur le feuillage, les nématodes sont en quête constante de larves et de chrysalides de thrips à parasiter. Lorsqu'ils localisent un hôte potentiel, ils y pénètrent par les voies naturelles. Une fois à l'intérieur, ils se multiplient et libèrent une bactérie spécifique qui tue rapidement l'hôte. Cette bactérie facilite également la décomposition de l'hôte, le transformant en une source de nourriture pour les nématodes. Cette alimentation est cruciale pour le cycle de développement complet des nématodes.

### Composition

86% *Steinernema feltiae* – 14% de support inerte biodégradable



	Quantité en millions	Surface Traitée	Volume d'eau en litre	Période d'application	Mode d'application	Conditions
<b>Thrips</b>	3	12 à 15 pots ou 3 m <sup>2</sup>	2	<b>Intérieur</b> Toute l'année	Pulvérisateur ou arrosoir	Température de l'air entre 14 et 35°
	5	20 à 25 pots ou 10 m <sup>2</sup>	5			
	10	20 m <sup>2</sup>	10	<b>Extérieur</b> si présence du nuisible et température > 14°		
	25	50 m <sup>2</sup>	25			
	50	100 m <sup>2</sup>	50			
	250	500 m <sup>2</sup>	250			