

<p>Palmiers Steinernema Carpocapsae</p> <p>Papillon du palmier <i>Paysandisia archon</i></p>  <p>Charançon rouge <i>Rhynchophorus ferrugineus</i></p>  <p>Disponible en 10, 25, 50, 100, 250 et 500 millions</p>	<p>Mouches du terreau Steinernema Feltiae</p>  <p>Disponible en 3, 5, 10, 25, 50, 100 et 250 millions</p>	<p>Thrips Steinernema Feltiae</p>  <p>Disponible en 5, 10, 25, 50, 100 et 250 millions</p>
<p>Tigre du platane Steinernema Carpocapsae</p>  <p>Disponible en 10, 25, 50, 100, 250 et 500 millions</p>	<p>Vers Gris - Chenilles Noctuelles Steinernema Carpocapsae</p> <p>Noctuidae</p>  <p>Disponible en 5, 10, 25, 50, 100 et 250 millions</p>	<p>Vers Blancs Heterorhabditis Bacteriophora</p> <p>Otiorynque - Hanneton</p>  <p>Disponible en 3, 10, 25, 50, 100 et 250 millions</p>
<p>Doryphore Steinernema Carpocapsae</p> <p>Doryphore de la pomme de terre</p>  <p>Disponible en 10, 25, 50, 100 et 250 millions</p>	<p>Notre opinion est précieuse pour nous ! Nous avons le plaisir de vous offrir un code promotionnel de 20%, valable sur votre prochain achat de nématodes sur notre site solunema.fr</p> <p>Pour obtenir votre code, faites une évaluation du produit que vous venez de recevoir, puis envoyez nous votre numéro de facture à l'adresse solunema@k3d.fr</p> <p>SOLUNEMA.FR</p> 	

Tigre du Platane

Steinernema Feltiae

Traitement par
NÉMATODES
Formulation Gel Longue durée



Corythucha ciliata



👍 Traitement du tronc et des branches au printemps ou feuillage l'été.

🚿 Application facile par pulvérisation

❄️ À conserver au frais dès réception

Tout Pour Les Nuisibles - France Nuisibles

31 Allée de la Poste
42470 Saint Symphorien de Lay



Infos-Conseils
04 74 05 25 56
solunema@k3d.fr

Le **Tigre du platane** (*Corythucha ciliata*) est un insecte nuisible qui attaque principalement les platanes. Reconnaisable à ses ailes striées ressemblant à celles d'un tigre, il mesure environ 5 à 6 mm de long. Les adultes ont un corps plat avec des ailes beige à brun clair. Ils se nourrissent de sève en perforant les feuilles, causant des taches blanchâtres et une décoloration. Les femelles pondent leurs œufs sur la face inférieure des feuilles, donnant naissance à des larves qui se nourrissent de la sève. Les infestations peuvent affaiblir les platanes et provoquer une chute prématurée des feuilles. Pendant les mois d'hiver, les insectes du Tigre du platane se réfugient sous les rhytidomes (écorce externe) des platanes, où ils entrent en dormance pour survivre aux conditions rigoureuses.

Les nématodes **Steinernema Feltiae** (SF) sont des vers microscopiques qui sont utilisés comme le traitement de biocontrôle contre le tigre du platane. Son utilisation est respectueuse de l'applicateur, de l'Homme et de son environnement. Ils sont livrés sous une forme de poudre granulueuse blanchâtre, plus ou moins humide.

Le traitement biologique par nématodes est possible à 3 périodes :

- Mars/avril - pulvérisation des troncs et des branches charpentières (avant la sortie du feuillage)
- Mai à Septembre - pulvérisation sur les feuilles des arbres
- Novembre - pulvérisation des troncs et des branches charpentières

IMPORTANT

- À conserver au frais entre 2 et 6 °C (pas de congélation) au réfrigérateur après réception jusqu'à utilisation et à l'abri de la lumière.
- Mettre à température ambiante 30 mn avant utilisation.
- À utiliser dès que les températures sont comprises entre 14 à 35° C.
- À utiliser tôt le matin ou tard le soir pour éviter les UV, car les nématodes sont sensibles aux UV.
- Les nématodes ne craignent pas la chaleur (<30°C), les conserver au froid vise uniquement à les plonger en cryptobiose, les maintenant ainsi en état de léthargie.
- À température ambiante, les nématodes continuent leur développement. Par contre sans "nourriture", ils finiront par mourir de "faim" au bout d'une semaine environ.
- Pulvérisation : Retirer les filtres, utiliser une buse diamètre > 0.5 mm (35 mesh), préférer une buse de type "jet conique" creux à haut débit.
- Ne pas conserver la solution une fois diluée dans de l'eau, les nématodes finiraient par mourir d'asphyxie.

TOUT POUR LES NUISIBLES

Des produits de pro pour une lutte efficace

Pièges, phéromones, répulsifs, matériel de traitement,
Venez découvrir des produits complémentaires sur notre site.
Depuis 2006 à votre service.

Toutes les commandes passées avant 14h sont expédiées le jour même.



PIEGEAGE
INSECTES

TOUTPOURLESNUISIBLES.FR



MATÉRIEL DE
TRAITEMENT



AUXILIAIRES



LUTTE
GASTEROPODE



RENFORCER
PRÉVENIR



Comment utiliser les nématodes pour traiter votre platane ?

1. Identifier le problème

Les symptômes visibles comprennent des taches blanchâtres ou jaunâtres sur les feuilles, une décoloration, un flétrissement et une chute prématurée des feuilles. Les nymphes et les adultes qui se nourrissent déposent des gouttes sombres d'excrément (miellat) sur la face inférieure des feuilles infestées. Pendant l'hiver, il est important de noter que les insectes du tigre du platane peuvent se cacher sous les rhytidomes des platanes. Il est donc recommandé de les rechercher attentivement afin de détecter les signes de présence de l'insecte.

2. Préparation

- Mettre les nématodes à température ambiante 30mn
- Remplir la cuve à moitié avec de l'eau fraîche et propre,
- Vider tous les sachets de nématodes dans un seau d'eau et mélanger pour dissoudre,
- Utiliser tous les sachets, ne pas les diviser,
- Mélanger soigneusement et s'assurer que l'ensemble du produit soit dispersé,
- Verser le contenu du seau dans la cuve,
- Compléter la cuve avec le volume d'eau nécessaire,
- Appliquer immédiatement la solution à tous les platanes à la dose appropriée,
- Toujours agiter la solution pendant l'application (retour de pompe)

3. Dosage

2 à 20 L par arbre (5 millions de nématodes par litre) selon la taille de l'arbre et la saison.

4. Application

Traitement du tronc : Avant d'appliquer la solution de nématodes sur le platane, humidifiez le tronc. Cela permettra aux nématodes de se déplacer plus facilement jusqu'à leur proie. Étant donné que les nématodes n'ont pas de pattes, ils utilisent l'humidité en combinaison avec les particules de l'arbre pour se déplacer.

Traitement du feuillage : Pulvériser largement sur le feuillage. Il est important qu'il n'y ait pas de vent lors des traitements, car les nématodes ont besoin de rentrer en contact avec les tigres du platane pour les parasiter. Les problèmes liés au vent sont dans un premier temps la dérive du traitement et dans un deuxième temps, le dessèchement trop rapide du produit.

Il est donc conseillé de traiter par temps couvert, voire même sous une légère pluie, qui ne gênera pas le traitement.

Température : Elle doit être comprise entre 14 °C et 30 °C. Les températures doivent rester supérieures à 14 °C pendant le traitement le plus longtemps possible. (Au minimum les 4 heures suivantes, 8 heures étant un seuil encore plus acceptable)

À l'inverse, des températures trop élevées sont aussi gênantes, car la bouillie de traitement se dessèche alors trop rapidement après l'application.

5. Surveillez les résultats


Les nématodes *Steinernema carpocapsae* agissent assez rapidement pour contrôler le tigre du platane. Vous devriez remarquer une diminution de la population de larves après quelques jours. Cependant, faites attention, car les nématodes traitent les larves, donc vous pourriez encore voir des adultes. Si les larves persistent, il est nécessaire de répéter le traitement.

Il est important de suivre les instructions d'application pour obtenir les meilleurs résultats dans le traitement du tigre du platane avec les nématodes *Steinernema Feltiae*.

Les nématodes *Steinernema feltiae* une fois pulvérisés, pénètrent par les voies naturelles de tous les stades mobiles (larves et adultes) du tigre du platane (*Corythucha ciliata*).

Composition

86% *Steinernema Feltiae* – 14% de support inerte biodégradable



Arroser l'arbre avant traitement

Sortir les nématodes 30min avant Disperser les dans 1L d'eau

Mélanger Attendre 5min



Verser la solution dans un arrosoir ou un pulvérisateur

Compléter avec de l'eau

Traiter le tronc et le feuillage Maintenir humide l'arbre pendant 7 jours

	Quantité en millions	Platanes Traités	Volume d'eau en litre	Période d'application	Mode d'application	Conditions
Tigre du platane Corythucha ciliata	10	1 (petit)	3	Mars/avril troncs Mai à Septembre feuillages Novembre troncs	Pulvérisateur, lance à jet, canon atomiseur	Température de l'air entre 14 et 35°
	25	1 à 2	5			
	50	2 à 3	10			
	100	4 à 6	20			
	250	10 à 15	50			
	500	20 à 30	100			