

Palmiers Steinernema Carpocapsae  Disponible en 10, 25, 50, 100, 250 et 500 millions	Mouches du terreau Steinernema Feltiae  Disponible en 3, 5, 10, 25, 50, 100 et 250 millions	Thrips Steinernema Feltiae  Disponible en 5, 10, 25, 50, 100 et 250 millions
Tigre du platane Steinernema Carpocapsae  Disponible en 10, 25, 50, 100, 250 et 500 millions	Vers Gris - Chenilles Noctuelles Steinernema Carpocapsae  Disponible en 5, 10, 25, 50, 100 et 250 millions	Vers Blancs Heterorhabditis Bacteriophora  Disponible en 3, 10, 25, 50, 100 et 250 millions
Doryphore Steinernema Carpocapsae  Disponible en 10, 25, 50, 100 et 250 millions		

Votre opinion est précieuse pour nous !
Nous avons le plaisir de vous offrir un code promotionnel de **20%**, valable sur votre prochain achat de nématodes sur notre site **solunema.fr**

Pour obtenir votre code, faites une évaluation du produit que vous venez de recevoir, puis envoyez nous votre numéro de facture à l'adresse **solunema@k3d.fr**

SOLUNEMA.FR



TOUT POUR LES NUISIBLES

Des produits de pro pour une lutte efficace

Pièges, phéromones, répulsifs, matériel de traitement,
Venez découvrir des produits complémentaires sur notre site.
Depuis 2006 à votre service.

Toutes les commandes passées avant 14h sont expédiées le jour même.



PIEGEAGE
INSECTES

TOUTPOURLESNUISIBLES.FR



AUXILIAIRES



LUTTE
GASTEROPODE



RENFORCER
PRÉVENIR



MATÉRIEL DE
TRAITEMENT

Vers Gris - Chenilles Noctuelles

Steinernema Carpocapsae

Traitement par
NÉMATODES
Formulation Gel Longue durée



Noctuidae



6 semaines d'efficacité

Application facile par arrosage
ou pulvérisation

À conserver au frais dès réception



Tout Pour Les Nuisibles - France Nuisibles

31 Allée de la Poste
42470 Saint Symphorien de Lay

Infos - Conseils
04 74 05 25 56
solunema@k3d.fr

Les **vers gris**, également connus sous le nom de **chenilles noctuelles**, sont des insectes nuisibles appartenant à différentes espèces de papillons nocturnes. Ces chenilles se nourrissent de diverses plantes, causant des dégâts considérables dans les jardins et les cultures.

Les vers gris ont un corps charnu et cylindrique, généralement de couleur gris foncé ou brun. Ils peuvent mesurer de quelques centimètres à plusieurs centimètres de longueur, selon l'espèce. Les chenilles se déplacent de nuit et se cachent généralement pendant la journée dans le sol, sous les feuilles ou dans d'autres abris végétaux.

Les dégâts causés par les vers gris sont principalement dus à leur **appétit vorace**. Les chenilles se nourrissent des feuilles, des tiges, des fleurs et même des racines des plantes. **Elles peuvent grignoter les feuilles jusqu'à la nervure principale**, laissant derrière elles des traces de mastication et des morceaux de feuilles déchiquetées. Les plantes infestées peuvent présenter un aspect défolié, affaibli et peuvent même mourir si l'infestation est sévère.

Les vers gris sont connus pour leur polyphagie, ce qui signifie qu'ils peuvent attaquer de nombreuses espèces végétales, y compris **les légumes, les fleurs, les arbres fruitiers et les plantes ornementales**. Leur cycle de vie comprend plusieurs stades de développement, allant de l'œuf à la chenille, puis à la nymphe et enfin au papillon adulte.

IMPORTANT

- À conserver au frais entre 4 et 6 °C (pas de congélation) au réfrigérateur après réception jusqu'à utilisation et à l'abri de la lumière.
- Mettre à température ambiante 30 mn avant utilisation.
- À utiliser dès que les températures sont supérieures entre à 10° C
- À utiliser tôt le matin ou tard le soir pour éviter les UV, car les nématodes sont sensibles aux UV.
- Maintenir la terre légèrement humide non détrempée pendant aux moins 15 jours après le traitement.
- Les Nématodes ne craignent pas forcément la chaleur (<30°C), les conserver au froid vise uniquement à les plonger en cryptobiose, les maintenant ainsi en état de léthargie.
- À température ambiante, les nématodes continuent leur développement. Par contre sans "nourriture", ils finiront par mourir de "faim" au bout d'une semaine environ.
- Pulvérisation : Retirer les filtres, utiliser une buse de diamètre > 0.5 mm (35 mesh), préférer une buse de type "jet conique" creux à haut débit.
- Ne pas conserver la solution une fois diluée dans de l'eau, les nématodes finiraient par mourir d'asphyxie.

Comment utiliser les nématodes pour traiter les vers blancs ?

1. Identifier le problème

Les signes de présence des vers gris sont souvent visibles sur les plantes. Les chenilles se nourrissent des feuilles, des tiges et des fleurs, laissant des traces de mastication, des morceaux de feuilles déchiquetées et parfois des excréments. Les plantes infestées peuvent présenter un aspect défolié, affaibli et peuvent même mourir si l'infestation est sévère. La présence des vers gris peut varier en fonction des espèces et des plantes affectées. Les chenilles noctuelles se cachent généralement dans le sol, sous les feuilles ou dans d'autres abris végétaux pendant la journée, ce qui rend leur détection plus difficile. Cependant, il est possible de repérer leur présence en examinant attentivement les parties touchées des plantes et en recherchant les chenilles elles-mêmes.

2. Quand traiter ?

La période de traitement la plus courante est généralement au printemps et en automne, lorsque les chenilles de vers gris sont les plus actives. Il est recommandé d'appliquer les nématodes au début de ces saisons, lorsque les chenilles sont encore petites et plus sensibles à l'infection par les nématodes.

3. Préparation de la solution de nématodes

Commencez par diluer le sachet entier de nématodes dans un petit récipient d'eau propre à température ambiante. Mélangez correctement, les grumeaux éventuels ne sont pas très graves. Ensuite, versez cette préparation dans un arrosoir ou un pulvérisateur et ajoutez-y 10 litres d'eau à température ambiante (entre 15°C et 25°C). Mélangez à nouveau.

4. Application par pulvérisation ou arrosage des nématodes

Assurez-vous que le sol est légèrement humide avant d'appliquer les nématodes. Cela facilitera leur mouvement et leur recherche des vers gris. Utilisez un arrosoir ou un pulvérisateur pour répandre la solution de nématodes sur la zone infestée ou sur toute la surface du jardin.

5. Continuer l'arrosage

Les nématodes ont besoin d'un environnement humide pour survivre. Pour maintenir leur efficacité, continuez d'arroser régulièrement la culture légèrement. Les nématodes ont besoin d'humidité pour se déplacer dans le sol et trouver les vers gris.

6. Surveiller les résultats

Les nématodes *Steinernema Carpocapsae* agissent en infectant les vers gris et en les tuant à l'intérieur de leur corps. Vous devriez observer une diminution progressive de la population de vers gris au fil du temps. Surveillez attentivement l'état des plantes pour évaluer l'efficacité du traitement. Si nécessaire, vous pouvez répéter l'application des nématodes pour assurer un contrôle complet de l'infestation.

Comment les nématodes agissent-ils ?

Les nématodes se déplacent dans le sol à la recherche des larves pour les parasiter. Quand ils les trouvent, ils pénètrent par les voies naturelles dans la larve et libèrent des bactéries symbiotiques. Ces bactéries transforment les tissus en nutriments assimilables permettant aux nématodes de se nourrir, de se développer et de se reproduire. Cela tue le ver gris dans les jours qui suivent l'infection.

Composition

86% *Steinernema Carpocapsae*. 14% de support inerte biodégradable



Arroser la terre avant traitement



Sortir les nématodes 30min avant Disperser les dans 1L d'eau



Mélanger Attendre 5min



Verser la solution dans un arrosoir ou un pulvérisateur



Compléter avec de l'eau



Traiter la terre Maintenir humide le sol tous les jours pendant 7 jours

	Quantité en millions	Surface Traitée	Volume d'eau en litre	Période d'application	Mode d'application	Conditions
Vers Gris	5	10m²	3	Interieur: Toute l'année	Pulvérisateur ou arrosoir	Température su sol > 12°
	10	20m²	5			
	25	50m²	12	Exterieur : si présence du nuisible et température > 14°		
	50	100m²	25			
	250	500m²	125			